

ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА АВТОСТИГМА НА ПСИХИЧНАТА БОЛЕСТ: МЕЖДУГРУПОВИ РАЗЛИКИ И НОРМИ

Анита Ферчева¹, Любомир Джалев²

¹Катедра по психиатрия, Медицински университет – София

²Нов български университет, Департамент по когнитивна наука и психология

anita.fercheva@gmail.com, ldjalev@nbu.bg

Резюме. Настоящата публикация е втората по ред, посветена на разработването и стандартизирането на един нов инструмент – Въпросника за оценка на автостигма на психичната болест. В първата публикация (Джалев и Ферчева, 2015) беше представено разработването на пилотната форма на въпросника, изследванията на скаловата му структура и на психометричните му характеристики на субскалово и скалово равнище.

Тази статия е фокусирана върху стандартизацията на въпросника. Представено е разпределението на айтемите по субскали, както и данни за тяхната ориентация при измерването на автостигмата. За адекватното определяне на вътрешногруповите норми е направено предварително изследване на междугруповите различия по осем социално-демографски и индивидуални признака, наблюдавани в рамките на пилотното изследване върху извадка от 252 психично болни лица.

Като вътрешногрупови норми за автостигмата на психичната болест са изведени средните стойности (M) и стандартните отклонения (SD) на баловете на групите, формирани по тези признаци, за отделните субскали и за общата скала. Такива норми са изчислени за онези субгрупи, между които е наблюдавана съществена разлика, установена чрез комплексен критерий, който включва статистическа значимост, големина на ефекта и мощност на критерия. Там, където не се наблюдава разлика или тя не удовлетворява комплексния критерий, нормите са изчислени въз основа на данните за цялата извадка. Като приложение е поместен Въпросникът за оценка на автостигма на психичната болест.

Ключови думи: стигма; автостигма; въпросник; скала; дисперсионен анализ; стандартизация; норма.
